

Europejska rekomendacja dezynfekcji przeciwko COVID-19

International Pharmaceutical Federation (FIP) podała listę środków dezynfekujących w zależności od obiektu, który mógł ulec skażeniu.

Lista została opracowana przez Chińskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne:

- powierzchnia obiektu - środek dezynfekujący zawierający chlor (1000 mg/l), dwutlenek chloru (500 mg/l), alkohol 75%;
- ręce - szybko schnący środek do dezynfekcji rąk zawierający alkohol, środek dezynfekujący zawierający chlor, nadtlenek wodoru (woda utleniona);
- skóra - środek dezynfekujący na bazie jodu 0.5%, nadtlenek wodoru;
- błona śluzowa - środek dezynfekujący na bazie jodu 0.05%;
- powietrze w pomieszczeniu - kwas nadoctowy, dwutlenek chloru, nadtlenek wodoru;
- zanieczyszczenia - środek dezynfekujący zawierający chlor (5000-20000 mg/l), proszek dezynfekujący lub proszek wybielający o właściwościach absorbujących;
- tekstylia: ubrania, pościel - środki dezynfekujące zawierające chlor (500 mg/l, tlenek etylenu)

Więcej na: <https://www.fip.org/>